EXERCICE 1

EXERCICE 2 :

Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire.

1) Analysez l'arbre généalogique du document 1, en vue de déduire si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif.

2) Une électrophorèse de l'A.D.N des cinq membres de la famille, désignés par les lettres A, B, C, D et E, a été réalisée.

Le résultat est représenté dans le document 2 (la tache la plus épaisse correspond à la fusion de 2 taches).

a – Exploitez les données des documents 1 et 2 en vue de déduire si le gène étudié est porté par :

- un autosome
- le chromosome sexuel X
- le chromosome sexuel Y

b – Associez le numéro de chaque individu de l'arbre généalogique du document 1 à la lettre qui lui correspond dans le document 2.

CORRIGE DE L'EXERCICE 1:

1°

hypothèse 1 : l'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par un autosome

soit le couple d'allèles (M, m)

M : allèle normal

m : allèle responsable de la maladie

d'après le document 3, l'individu II₁ de génotype m//m et l'individu II₄ de génotype m//m descendent des parents I₁ de génotype M//m et I₂ de génotype m//m.

d'après le document 4, II₁ possède un allèle normal et un allèle muté, il ne peut pas être de génotype m//m. l'hypothèse est à rejeter.

1) L'individu II₃, atteint, provient de 2 parents phénotypiquement sains → l'allèle anormal est récessif

2)

- **gène porté par un autosome**

- Les parents I₁ et I₂, phénotypiquement sains, doivent être tous deux hétérozygotes pour avoir l'enfant atteint II₃; or, selon le doc 2, il y a un seul individu hétérozygote (E).
- Le doc 2 montre que les individus A, C et D ont un seul allèle du gène.
- Le garçon II₃, atteint, a un seul allèle qui est anormal (doc 2) → Cet allèle est situé au niveau d'un chromosome sexuel.

Déduction : le gène n'est pas porté par un autosome

- **gène porté par le chromosome sexuel X**

- Le document 2 montre que certains individus (A, C et D) ont un seul allèle du gène
- L'individu malade II₃ a un seul allèle anormal, d'après le doc 2 (individu D)

Déduction : le gène peut être porté par le chromosome sexuel X

- **gène porté par le chromosome sexuel Y**

- Le père I₁, sain, doit avoir des garçons tous sains. Or, il a eu un garçon II₃ atteint.

Déduction : Le gène ne peut être porté par le chromosome Y

Conclusion : Le gène est porté par le chromosome sexuel X

Individus	II ₃	I ₂	II ₁	I ₁	II ₂
Lettres	D	E	B	A ou C	C ou A

génotypes :

individus	génotypes
I ₁	X ^m Y
I ₂	X ^M X ^m
II ₂	X ^m X ^m
II ₃	X ^m Y

CORRIGE DE L'EXERCICE 2 :

- Génétique humaine Exercice 3

Le document 6 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire.

Grâce aux techniques de biologie moléculaire, on peut distinguer l'ADN muté responsable de cette maladie de l'ADN normal. L'analyse de l'ADN effectuée chez certains membres de cette même famille figure dans le document 7.

Document 6

Individus	I ₁	I ₂	II ₁	III ₃
ADN normal	+	-	+	+
ADN muté	+	+	-	+

(+): présence (-): absence

Document 7

- En utilisant les données du document 6 et du document 7, discutez les hypothèses suivantes. Indiquez celles qui vérifient les données du document 6
  - l'allèle de la maladie est dominant
  - l'allèle de la maladie est récessif
  - l'allèle de la maladie est autosomal
  - l'allèle de la maladie est lié au chromosome sexuel
- Donnez les génotypes des individus I₂, II₂, II₆ et III₄.

Exercice 4

L'arbre généalogique du document 3 représente la transmission d'une maladie héréditaire chez une famille.

Vous êtes appelé à discuter toutes les hypothèses proposées. Corrigé de l'exercice 4
 Pour la 2^e question, vous pouvez exploiter les résultats des deux électrophorèses ou seulement l'électrophorèse de II₂.

1^o

H₁ : l'allèle de l'anomalie est récessif autosomique :

Soit le couple d'allèles (S, m) avec :

S → sain

m → malade S>m

l'individu II₁ est malade de génotype m // m, il aurait reçu un allèle m de son père I₁ malade et un allèle m de sa mère saine hétérozygote de génotype S//m, ce qui est possible

H₁ est à retenir.

H₂ : l'allèle de l'anomalie est dominant et porté par un autosome :

Soit le couple d'allèles (M, s) avec :

M → malade

s → sain M>s

L'individu II₁ malade de génotype M // s, aurait reçu l'allèle M de son père malade et l'allèle s de sa mère homozygote s/s, ce qui est possible → H₂ est à retenir

H₃ : l'allèle de l'anomalie est récessif et porté par un chromosome sexuel X

Soit le couple d'allèles (S, m) avec :

S → sain

m → malade S>m

L'individu II₁ malade de

le chromosome Y de son père et